



Bollettino periodico del 20/07/2026

CENTRO OPERATIVO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

BIELLESE, ALTO VERCELLESE ed EPOREDIESE

R.T.S. dott. Bruciaferri Davide tel. 348/3018155 e-mail: zanzare.biellese@gmail.com

Periodo di riferimento: 13 - 19 luglio 2026

Anche nella settimana di riferimento il Centro Operativo è stato molto impegnato sul fronte dei trattamenti notturni di contrasto agli adulti di zanzara. La siccità estiva ha ridotto notevolmente il numero di focolai di sviluppo larvale infestati, riducendo di conseguenza gli interventi a loro carico. Per le Amministrazioni che non l'avessero ancora fatto, si suggerisce la pubblicazione della specifica Ordinanza Sindacale in previsione dell'aumento fisiologico stagionale del numero di esemplari di zanzara tigre, specie tipicamente tardiva che raggiunge il suo picco di presenza verso la fine di agosto/primi di settembre. L'Ordinanza, stilata sulla base del modello proposto ad inizio stagione, contiene tutte le indicazioni volte alla prevenzione in ambito domestico e in quello delle aree verdi private, andando ad evidenziare la necessità di un contributo attivo da parte di tutta la cittadinanza.

Trattamenti di disinfestazione effettuati nei Comuni

Comune	Repellenti (o adulticidi se indicati) (Prodotti utilizzati: estratti vegetali all'aglio; piretroidi nel caso di adulticidi) 	Larvicidi Caditoie (Prodotto utilizzato: B.t.i.+ B.s.) 	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>) 
AZEGLIO			14/07 Trattamento lungo le sponde di tutto il lago mediante atomizzatore montato su imbarcazione
BIELLA	✓ (13/07 Chiostro S. Sebastiano) (17/07 asili di Chiavazza, Masarone, Rogge e Vernato; abbattente per gli ultimi tre)		2015BI, 2018BI, 2019BI
BANCHETTE		✓	
BORGOSIA	✓ (13/07 Parcheggio Palazzetto via Marconi)		3B017BG, 3B022BG, 3B021BG, 3B023BG, 3B036BG
BUROLO	✓ (14/07 area Comune, campo tennis e giardini scuola)	✓	
CAMBURZANO			1B010CA
CANDELO	✓ (17/07 asilo nido XXV aprile)		
CHIAVERANO		✓	
COSSATO		✓	
DORZANO		✓	



Comune	Repellenti (o adulticidi se indicati) (Prodotti utilizzati: estratti vegetali all'aglio; piretroidi nel caso di adulticidi)	Larvicidi Caditoie (Prodotto utilizzato: B.t.i.+ B.s.)	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>)
			
GATTINARA			3B004GT,3B006GT,3B004GT,3B057GT
LESSONA		✓	
MONTALTO DORA		✓	
OCCHIEPPO SUP.			1B015OC
PALAZZO			1A010PA,1A012PA
PIVERONE			1A014PV,1A035PV 14/07 Trattamento lungo le sponde di tutto il lago mediante atomizzatore montato su imbarcazione
ROASIO	✓ (14/07 via M. d'Azeglio festa Santa Maria)		
ROPPOLO			1A019RP
RUEGLIO	✓ (14/07 area adiacente pluriuso)	✓	
VALDILANA	✓ (14/07 Vallemosso S. Eusebio + Fraz. Gioia)		3A018MO
VIDRACCO		✓	
VIGLIANO			2024VI,2026VI
VILLANOVA		✓	4B014VN
VIVERONE			14/07 Trattamento lungo le sponde di tutto il lago mediante atomizzatore montato su imbarcazione

Attività di monitoraggio degli adulti

I dati di cattura delle forme alate si mantengono praticamente stabili; dalla settimana in corso sembrerebbe che gli stessi stiano cominciando a subire una flessione verso il basso ma la loro elaborazione è ancora in via di sviluppo. Stabili rimangono anche i casi di superamento della soglia di tolleranza per l'abbondanza di *Ochlerotatus caspius*, che si mantiene al di sopra del 95% sul totale delle specie catturate.

Di seguito si riportano i dati di dettaglio.

	3/6/2026	9/6/2026	16/6/2026	23/6/2026	30/06/2026	07/07/2026	14/07/2026
SOMMA TOT	1055	1836	4089	11927	5671	5521	5666
n°trappole	24	23	25	25	26	25	25
MEDIA CATTURE PER TRAPPOLA	43,96	79,83	163,56	477,08	218,12	220,84	226,64
SUPERAMENTO SOGLIA DI TOLLERANZA %	21	61	72	100	81	84	88




Di seguito i dati di cattura riferiti a ciascuna stazione di monitoraggio, ordinati in base al totale catture.

Stazione	3/6/26	9/6/26	16/6/26	23/6/26	30/6/26	7/7/26	14/7/26	totali per stazione
Azeglio	58	255	213	1799	598	934	532	3857
Zimone	34	304	270	1660	360	522	400	3150
Strona	24	11	425	1666	447	72	484	2645
Burolo	14	115	343	1210	489	359	353	2530
Mongrando	25	144	573	824	345	605	472	2516
Viverone	50	73	191	1100	549	542	265	2505
Biella (centro)	53	201	858	318	249	132	96	1811
Montalto Dora	11	0	263	842	338	266	854	1720
Valdilana	19	46	48	88	620	438	138	1259
Gattinara	577	121	59	135	225	72	121	1189
Verrone	57	109	220	241	380	158	257	1165
Occhieppo Sup.	5	44	94	322	232	360	87	1057
Chiaverano	4	26	46	455	254	236	423	1021
Lessona	37	50	179	193	90	125	129	674
Ivrea	8	23	48	55	20	234	51	388
Cascinette	3	12	40	229	53	0	93	337
Muzzano	1	22	60	138	34	42	17	297
Borgosesia	0	85	2	97	88	21	10	293
Vigliano	7	20	22	75	64	86	137	274
Gaglianico	4	2	43	185	12	20	8	266
Rovasenda	38	94	15	0	51	31	226	229
Cossato	10	41	0	73	41	51	75	216
Sostegno	10	6	32	48	56	63	0	215
Candelo	3	21	29	50	19	74	289	196
Biella (Chiavazza)	0	6	12	61	44	55	63	178
Banchette	3	5	4	63	13	23	86	111
totali generali	1055	1836	4089	11927	5671	5521	5666	30099

Attività di monitoraggio zanzara tigre

I dati di cattura relativi alla z. tigre confermano una certa tendenza alla crescita mantenendosi tuttavia entro i valori medi stagionali.



Nella tabella seguente si riportano i dati più significativi del monitoraggio finora condotto.

	DATA DI POSIZIONAMENTO			
	20/05	03/06	16/06	30/06
n° ovitrappole conteggiabili	102	94	92	103
tot uova catturate	5703	5938	9322	7484
Num. medio uova/14 gg/ ovitrappola	56	63	101	73
% ovitrappole positive	72	84	88	83
casi critici	14	14	12	14

Valori di cattura significativamente elevati si sono osservati in una percentuale relativamente bassa di casi come per Gattinara (Gt004) con 462 uova, Azeglio (AZ002) con 325, Cerrione (CR001) con 430 e Burolo (BU001) con 521.

Di seguito si segnalano le stazioni che, per la ripetitività dei casi critici, meritano tuttavia di essere sottoposte a dei controlli per individuare la presenza di focolai particolarmente attivi.

GATTINARA	GT004
ROASIO	RO002
CERRIONE	CR001
BANCHETTE	BA003
CASCINETTE	CI003

Previsioni sui livelli di molestia e considerazioni finali

Per il prossimo periodo si prevede un'attenuazione della molestia dovuta alla presenza di zanzare di risaia ma, in cambio, si prevede un aumento della stessa causata dalla crescita delle popolazioni di zanzara tigre, le cui abitudini ematofaghe riguardano anche le ore diurne. Stiamo entrando, come dimostrano i dati degli anni scorsi, nel periodo di maggiore diffusione del virus West Nile. Alcuni casi hanno già interessato la vicina Provincia di Novara e diventa importantissimo puntare sulla prevenzione e sull'informazione. Come già ricordato, si suggerisce alle Amministrazioni che non l'avessero ancora fatto, di pubblicare l'Ordinanza specifica, per mettere in atto tutte le azioni a loro disposizione, come previsto dal Piano Nazionale Arbovirosi del Ministero della Salute.

Si ricorda che il Virus West Nile è ormai da ritenere autoctono per la nostra Regione ed è trasmesso dalla zanzara comune (*Culex pipiens*) che trova come ambienti di sviluppo preferenziali modesti corsi d'acqua (come fossi di scolo o di irrigazione) e piccole raccolte d'acqua anche artificiali, come i bidoni degli orti. La vicinanza di habitat naturali favorisce la proliferazione di forme biologiche di zanzara che effettuano il loro pasto di sangue sia sugli umani che sugli uccelli è ciò rende il nostro territorio piuttosto favorevole e suscettibile. Per fortuna i casi gravi dell'infezione sono rari ma non da escludere ed ecco perché la prevenzione rimane la forma principale di difesa a nostra disposizione.